

Srinagarind Pharmacy Newsletter

April 2025 | Issue 34



TABLE OF CONTENTS

Drug Safety Updates.....P. 2

- GLP-1 และ Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonists กับความเสี่ยงต่อการสำลักระหว่างการดมยาสลบหรือการให้ยาระงับความรู้สึกแบบลึก(deep sedation)

New Drugs @Srinagarind.....P. 4

- Zoely®(Nomegestrol acetate 2.5 mg and Estradiol (as hemihydrate)1.5mg)
- ESTROMON®F.C.Tablets 0.625mg (Conjugated Estrogen)
- COXIUM-S PLUS® POWDER (Glucosamine Sulfate Sodium Chloride and Chondroitin Sulfate Sodium)
- EXIB®120 (ETORICOXIB 120 mg)

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท/ยาเดิมความแรงใหม่.....P. 10

- FluQuadri® INJ 0.5ml(Quadrivalent Influenza Vaccine) 2025 Formula
- DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED FOR ADULTS AND ADOLESCENTS
- Berirab®P INJ (Human RabiesImmunoglobulin (HRIG) 300 IU /2ml INJ)
- Ulcefate® (Sucralfate Suspension 1g/5ml)
- Neutapin® 25 mg (Quetiapine 25 mg)
- Ranclav®Tablets 1g (Amoxicillin 875 mg + Clavulanate Potassium 125 mg)



Editorial board

ที่ปรึกษา: ทย.รัชฎาพร สุนทรภาส

บรรณาธิการ: ทย.ณานิ สโมส

กองบรรณาธิการ: ทย.พันธ์ุ ชุมวรฐายี

งานสารสนเทศทางยาและสนับสนุนบริการเภสัชกรรม

043-363282



Drug safety update



DRUG SAFETY UPDATE

GLP-1 และ Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonists กับความเสี่ยงต่อการสำลักระหว่างการดมยาสลบหรือ การให้ยาระงับความรู้สึกแบบลึก(deep sedation)



มกราคม 2025 สำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร(MHRA) ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists และ dual GIP/GLP-1 receptor agonists ซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือ โรคอ้วน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักอาหาร(pulmonary aspiration) ในระหว่างการดมยาสลบทั่วไป (general anesthesia) หรือการให้ยาระงับความรู้สึกแบบลึก(deep sedation)

คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

- พิจารณาความเสี่ยงของการสำลักในผู้ป่วยที่ใช้ยา GLP-1 หรือ GIP/GLP-1 receptor agonists ก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องใช้การดมยาสลบหรือการให้ยาระงับความรู้สึก
- สอบถามผู้ป่วยถึงประวัติการใช้ยา GLP-1 receptor agonists หรือ GIP/GLP-1 receptor agonists อย่างละเอียด ขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงการใช้ยาในกลุ่มนี้ออกเหนือใบสั่งแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความงาม เพื่อลดน้ำหนัก
- พิจารณาปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น ภาวะgastroparesis โรคอ้วน หรือโรคกรดไหลย้อน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการสำลัก
- ปรับแผนการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้
- แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าควรแจ้งแพทย์หรือทีมดูแลสุขภาพหากกำลังใช้ยา GLP-1 หรือ GIP/GLP-1 receptor agonists ก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องใช้การดมยาสลบหรือการให้ยาระงับความรู้สึก
- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเกิดภาวะสำลักในปอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาGLP-1 receptor agonists หรือ GIP/GLP-1 receptor agonists

ประเด็นสำคัญ:

- ยาในกลุ่มนี้มีผลทำให้การเคลื่อนตัวของอาหารออกจากกระเพาะอาหารช้าลง (delayed gastric emptying)
- ถึงแม้ผู้ป่วยจะงดอาหารก่อนการผ่าตัดตามคำแนะนำแล้ว แต่ก็อาจยังมีอาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้
- อาจเพิ่มความเสี่ยงที่อาหารหรือของเหลวในกระเพาะอาหารจะไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารและสำลักเข้าไปในปอดในระหว่างการให้ยาดมสลบหรือการให้ยาระงับความรู้สึกแบบลึก
- มีรายงานการเกิดการสำลักอาหาร (pulmonary aspiration) และการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น aspiration pneumonia ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา กลุ่ม GLP-1 และ dual GIP/GLP-1 receptor agonists ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกในระหว่างการผ่าตัด



ยาที่เกี่ยวข้อง

GLP-1 receptor agonists:

- **Dulaglutide** (Trulicity®)
- **Liraglutide** (Saxenda®, Victoza®, Xultophy®)
- **Lixisenatide** (Lyxumia®)
- **Semaglutide** (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®)
- **Exenatide** (Byetta®, Bydureon®)

Dual GIP/GLP-1 receptor agonists

- **Tirzepatide** (Mounjaro®)

หมายเหตุ : ชื่อการค้าที่ขีดเส้นใต้คือผลิตภัณฑ์ที่มีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

REFERENCE:

1. MEDICINES AND HEALTHCARE PRODUCTS REGULATORY AGENCY (MHRA). GLP-1 AND DUAL GIP/GLP-1 RECEPTOR AGONISTS: POTENTIAL RISK OF PULMONARY ASPIRATION DURING GENERAL ANAESTHESIA OR DEEP SEDATION. DRUG SAFETY UPDATE [INTERNET]. 2025 JAN;18(6):1. AVAILABLE FROM: [HTTPS://WWW.GOV.UK/DRUG-SAFETY-UPDATE/GLP-1-AND-DUAL-GIP-SLASH-GLP-1-RECEPTOR-AGONISTS-POTENTIAL-RISK-OF-PULMONARY-ASPIRATION-DURING-GENERAL-ANAESTHESIA-OR-DEEP-SEDATION](https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-and-dual-gip-slash-glp-1-receptor-agonists-potential-risk-of-pulmonary-aspiration-during-general-anaesthesia-or-deep-sedation)

New drug @Srinagarind



Zoely®(โซลีย์)

(Nomegestrol acetate 2.5mg
and Estradiol (as hemihydrate)1.5mg)



ยากุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ตัวยาสำคัญและความแรง : Nomegestrol acetate 2.5 mg and Estradiol (as hemihydrate)1.5 mg

กลุ่มยา : Contraceptive; Estrogen and Progestin Combination

รูปแบบยา : film-coated tablets (ยาเม็ดสีขาวมีฮอร์โมน 24 เม็ด + ยาเม็ดสีเหลืองที่ไม่มีฮอร์โมน 4 เม็ด)

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับการคุมกำเนิด โดยวิธีรับประทาน

ขนาดและวิธีใช้ยา : รับประทานยาวันละ 1 เม็ดติดต่อกันเป็นเวลา 28 วันทุกวันเวลาเดียวกันตามลำดับวันในแผง โดยไม่เว้นช่วง รับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้

ข้อห้ามใช้ : มีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (VTE),ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตัน, โรคตับรุนแรง, เคยมีมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน เช่น มะเร็งเต้านม

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, ความต้องการทางเพศลดลง, สีผิว, มีเลือดประจำเดือนผิดปกติ

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 แผง, แผงละ 28 เม็ด

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-30°C

Item Code : TZOELY

Item Name : Zoely 28 TAB

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ชำระเงินเอง)

Zoely® (โซลีย์)

(Nomegestrol acetate 2.5mg
and Estradiol (as hemihydrate) 1.5mg)



ยากุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ข้อดีของผลิตภัณฑ์นี้

- ✓ **มี Estradiol (E2)** เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติ อาจลดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เมื่อเทียบกับยากุมที่ใช้ Ethinylestradiol (EE)
- ✓ **มี Nomegestrol acetate (NOMAC) (Fourth generation Progestin)**
 - โครงสร้างคล้ายฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนตามธรรมชาติ มี selectivity สูงต่อ progesterone receptor
 - มีฤทธิ์แอนโดรเจนต่ำ : โอกาสเกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง เช่น สิว ผิวมัน หรือขนดก
 - Half-life ยาว : ซึ่งอาจช่วยให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายคงที่และสม่ำเสมอมากขึ้นตลอดรอบเดือน
- ✓ **รูปแบบ 24/4 regimen** → ให้ระดับฮอร์โมนสม่ำเสมอ ลดอาการที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนลดลงช่วงหยุดยา เช่น ปวดศีรษะ อารมณ์แปรปรวน
- ✓ **ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดสูง**: Pearl Index 0.4-1.2

ESTROMON[®]

F.C.Tablets 0.625mg (Conjugated Estrogen)



ตัวยาสําคัญ : Conjugated Estrogen 0.625 mg

กลุ่มยา : Estrogens (ฮอร์โมนเอสโตรเจน)

รูปแบบยา : FILM COATED TABLET

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการขาดเอสโตรเจนทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และที่ถูกลดลงหรือขาดไปโดยการผ่าตัดในระยะหมดประจำเดือน หรือหลังจากหมดประจำเดือน รวมถึงการฟ้อของอวัยวะเพศส่วนนอกของสตรีและช่องคลอด, ป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุนที่เกิดเนื่องมาจากภาวะขาดเอสโตรเจนทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและที่ถูกลดลงหรือขาดไปโดยการผ่าตัด

วิธีใช้ยา : ขนาดยาปกติสำหรับผู้ใหญ่ คือ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : แผงละ 10 เม็ด, กล่องละ 10 แผง

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิห้อง ต่ำกว่า 25°C

Item Code : TESTROMON625

Item Name : Conjugated estrogens(Estromon) 625mcg TAB
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ชื่อการค้าเดิมที่เคยมีในเภสัชตำรับsw. : Premarin® 0.625 mg TAB

COXIUM-S PLUS POWDER

(โคเซียม เอส พลัส ชนิดผง)



ตัวยาสําคัญ : ใน 1 ซองประกอบด้วย

- GLUCOSAMINE SULFATE SODIUM CHLORIDE 1884 MG (EQUIVALENT TO GLUCOSAMINE SULFATE 1500 MG)
- CHONDROITIN SULFATE SODIUM 1,200 MG

กลุ่มยา : OTHER DRUGS ACTING ON MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

รูปแบบยา : POWDER FOR ORAL SOLUTION

ข้อบ่งใช้ : ใช้บรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม(osteoarthritis) ได้แก่ บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม และการทำงานของข้อเข่าที่บกพร่องจากโรคข้อเสื่อม

ขนาดและวิธีใช้ยา : รับประทานวันละ 1 ซอง ก่อนอาหาร 15 นาที โดยเทผงยาในน้ำ 1 แก้ว คนให้ละลายก่อนรับประทาน

ข้อควรระวัง :

- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้สัตว์น้ำมีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง, ปู
- ผลของยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม coumarin (เช่น Warfarin) อาจเพิ่มขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับยานี้ ต้องมีการติดตามภาวะการแข็งตัวของเลือดอย่างใกล้ชิด

อาการไม่พึงประสงค์ : รู้สึกไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย ปวดศีรษะ

ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง บรรจุ 30 ซอง

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

เงื่อนไขการสั่งใช้ยา :

- สั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ สาขา ออร์โธปิดิกส์ เท่านั้น
- ขนาดยา Glucosamine Sulfate ที่แนะนำคือ 1500 mg/วัน
- การสั่งใช้ยาต้องไม่เกินครั้งละ 12 สัปดาห์ (84ซอง)

ยาเติมความแรงใหม่

ETORICOXIB 120 mg

ชื่อการค้า EXIB®120 (เอ็กซ์บ120)



นำเข้าเพิ่มเติมอีก 1 ความแรง

ITEM CODE : TEXIB120

Item Name : Etoricoxib(Exib) 120mg TAB

กลุ่มยา : Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID), COX-2 Selective

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 30 เม็ด (3x10's)

รายการยา Etoricoxib ในรพ.ศรีนครินทร์ มี 4 ความแรง คือ

- Arcoxia 30 mg TAB
- Etoricoxib(Sandoz) 60mg TAB
- Etoricoxib(Auxib) 90mg TAB
- Etoricoxib(Exib) 120mg TAB

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท



ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

INFLUENZA VACCINE

เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า

FluQuadri® INJ 0.5ml (Quadrivalent Influenza Vaccine) 2025 Formula

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปี2025



วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับภูมิภาคซีกโลกใต้
ปีค.ศ.2025

(Southern hemisphere(SH) 2025)

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus



แทนยาเดิม

Vaxigrip Tetra® INJ 0.5ml

เปลี่ยนแปลง CODE ยา

Item code : IINFLUVAC4

Item Name : Influenza Vaccine(Fluquadri) 0.5 ml INJ

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C , ห้ามแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ : 1 กล่องบรรจุ 5 prefilled syringe (หลอดละ 0.5ml)

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (วัคซีน ชำระเงินเอง)

หมายเหตุ : วัคซีน 1 หลอดจ่ายพร้อมหัวเข็มฉีดยาเบอร์ 27Gที่แถมมา 1 อัน

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

FluQuadri® INJ 0.5ml (Quadrivalent Influenza Vaccine) 2025 Formula

ขนาดและตารางการให้วัคซีน FluQuadri®

อายุ	ประวัติการได้รับวัคซีน	ขนาดยา	Schedule
6-35 เดือน	ไม่เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน	2 โด๊ส ขนาด 0.25 หรือ 0.5ml	ฉีดห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
	เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน	1 หรือ 2 โด๊ส ขนาด 0.25 หรือ 0.5ml	ฉีดห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
36 เดือน – 8ปี	ไม่เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน	2 โด๊ส ขนาด 0.5ml	ฉีดห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
	เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน	1 หรือ 2 โด๊ส ขนาด 0.5ml	ฉีดห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์
9 ปีขึ้นไป	-	1 โด๊ส ขนาด 0.5 ml	-



ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท


DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED

FOR ADULTS AND ADOLESCENTS

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต (dT Vaccine)

เปลี่ยนใช้ยานำเข้าโดยบริษัท มาสุ จำกัด
แทนยาเดิม

Adsorbed Td Vaccine INJ 0.5 ml



เปลี่ยนแปลง CODE ยา

Item code : IDTMASU

Item Name : dT(Masu) Vaccine INJ 0.5ml


การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C , ห้ามแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ : หลอดละ 0.5ml 1 โด๊ส

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

Human Rabies Immunoglobulin(HRIG) 300 IU /2ml INJ



เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า

Berirab®P INJ

แทนยาเดิม

HRIG(Kam RAB) INJ 300 IU



อิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เปลี่ยนแปลง CODE ยา

Item code : IBERIRAB300

Item Name : HRIG (Berirab-P) 300 IU /2ml INJ

ขนาดยาที่ใช้ : 20 IU/Kg

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C , ห้ามแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ : 1 กล่องบรรจุ 1 prefilled syringe with 2ml (300IU)

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

Sucralfate

Suspension 1g/5ml

เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า

Ulcefate® (อัลซีเฟต)

แทนยาเดิมชื่อการค้า **Sucrate® Gel**



เปลี่ยนแปลง CODE ยา

Item code : SULCEFA5

Item Name : Ulcefate 1g/ 5 ml SUSPENSION SACHET

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 20 ซอง, ซองละ 5 ml

ผลิตภัณฑ์ Sucralfate ที่มีในเภสัชตำรับ ได้แก่


- Sucralfate(Ulcefate) 1g TAB
- Ulcefate 1g/ 5 ml SUSPENSION SACHET

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

QUETIAPINE 25 MG

2nd Generation (Atypical) Antipsychotic

เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า
Neutapin® 25 mg
(นิวทาพิน)



แทนยาเดิม

Quetiapine(Quantia) 25mg TAB

เปลี่ยนแปลง CODE ยา

Item code : TNEUTAPIN25

Item Name : Quetiapine(Neutapin) 25mg TAB

ขนาดบรรจุ : แผงละ 10 เม็ด, กล่องละ 3 แผง

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ Quetiapine ที่มีในเภสัชตำรับรพ.ศรีนครินทร์ ได้แก่

- Quetiapine (Neutapin) 200 mg TAB (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)
- Quetiapine (Neutapin) 25 mg TAB (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
- Seroquel XR 50 mg TAB (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
- Seroquel XR 150 mg TAB (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
- Seroquel XR 300 mg TAB (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)
- Seroquel XR 400 mg TAB (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

Amoxicillin + Clavulanate Potassium (875 mg / 125 mg) เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า Ranclav[®] Tablets 1g (แอมคลาฟ) แทนยาเดิม AMK[®] 1gTAB



เปลี่ยนแพคเกจ CODE ยา

Item code : TRANCLAV1

Item Name :

Amoxicillin/Clavulanic(Ranclav) 875/125mg TAB

ขนาดบรรจุ : แพคเกจ 4 เม็ด (1 กล่องบรรจุ 25 แพคเกจ)