


คำแนะนำการใช้ยาพาร์กินสันชนิดแผ่นแปะผิวหนัง

บริเวณที่แนะนำสำหรับปิดแผ่นยาใน **28 วัน**

ตัวอย่าง
การกากบาทดังนี้

1

X



* ควรปิดแผ่นยาวันละ **1** ครั้ง เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน ทำเครื่องหมาย **X** เรียงตามวันดังรูป เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ควรปิดแผ่นยาดำแหน่งเดิมภายใน 14 วัน!



Abbott

คำแนะนำการใช้ยาพาร์กินสันชนิดแผ่นแปะผิวหนัง

วิธีการปิดแผ่นยา

- 

1 เปิดซองบรรจุยาโดยจับซองไว้ทั้งสองด้าน
- 

2 ลอกแผ่นฟอยล์เปิดซองออก
- 

3 นำแผ่นยาออกจากซอง
- 

4 จับแผ่นยาด้วยมือทั้ง 2 ข้าง โดยให้แผ่นปิดอยู่ด้านหน้า
- 

5 ปิดแผ่นยาไปครึ่งทางเพื่อให้รอยตัดรูปตัวเอสของแผ่นปิดหน้าเปิดออก
- 

6 ลอกแผ่นปิดหน้าด้านหนึ่งออกอย่าให้นิ้วถูกด้านที่มีกาวของแผ่นยา
- 

7 จับด้านที่มีแผ่นปิดหน้าอยู่ปิดด้านที่มีกาวลงบนผิวหนัง กดให้ติดแน่น
- 

8 พับแผ่นยาด้านที่มีแผ่นปิดหน้าอีกด้านกลับมาและลอกแผ่นปิดหน้าออก
- 

9 กดแผ่นยาลงให้ติดแน่นด้วยอุ้งมือเป็นเวลานานประมาณ 30 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นยาสัมผัสกับผิวหนังและขอบแผ่นยาดัดแน่นดี
- 

10 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีที่เสร็จการปิดแผ่นยา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก