



Srinagarind Pharmacy Newsletter

Pharmacy Team

บริการด้วยใจตลอด 24 ชั่วโมง



TABLE OF CONTENTS

Pharmacy News.....P. 2

- โครงการรีไซเคิลปากกาอินซูลิน

New Drugs(ยาใหม่เข้าเภสัชตำรับรพ.).....P.4

- Loco^a® Transdermal Patch (Esfurbioprofen)
- OSTENIL[®] plus INJ.2% (Sodium hyaluronate)
- SII Pneumosil[™] INJ (Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine Adsorbed)

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท/ยาเดิมความแรงใหม่....P.10

Medication Safety Alert.....P.14

- เฝ้าระวัง Medication Error จากยาหลายความแรง

EDITORIAL BOARD

ที่ปรึกษา: ญ.รัชฎาพร สุนทรภาส

บรรณาธิการ: ญ.ฉานี สโมสร

กองบรรณาธิการ: ญ.ผันสุ ชุมวรฐายี

งานสารสนเทศทางยาและสนับสนุนบริการเภสัชกรรม

043-363282

PHARMACY NEWS



ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาทุกตึกในรพ.ศรีนครินทร์

NEW DRUGS

(ยาใหม่เข้าเภสัชตำรับรพ.ศรีนครินทร์)



LOCOA®

40mg Transdermal patch

(โลควา)



NEW
PRODUCT



Once-Daily NSAIDs Transdermal Patch
ตัวยาสําคัญ : Esflurbiprofen (เอสเฟลอร์ไบโพรเฟน)

ตัวยาสําคัญ : ESFLURBIPROFEN

ความแรง : 40 mg/แผ่น

กลุ่มยา : Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

รูปแบบยา : TRANSDERMAL PATCH

ข้อบ่งใช้ : ใช้บรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบเนื่องมาจากสาเหตุโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)

ขนาดและวิธีใช้ยา :

- แปะแผ่นยาบริเวณที่มีอาการวันละ 1 ครั้ง
- ห้ามใช้มากกว่า 2 แผ่นต่อวัน
- ห้ามแปะแผ่นยามากกว่า 2 แผ่นในคราวเดียวกัน
- ยา 1 แผ่นแปะได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ห้ามแปะแผ่นยาบริเวณที่มีแผล เยื่อเมือก ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่น

ขนาดบรรจุ : 7 แผ่น/ซอง, กล่องละ 10 ซอง

การเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

Item Code : ELOCOA40

Item Name : Loco 40 mg TRANSDERMAL 7 PATCH

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

หมายเหตุ : ควบคุมการสั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ อายุรศาสตร์โรคข้อ จ่ายไม่เกิน 2 ซอง/เดือน (1 ซอง มี 7 แผ่น คิดราคาหน่วยนับต่อ 1 ซอง ไม่แยกจ่ายเป็นแผ่น)

คำแนะนำการใช้แผ่นแปะ Esflurbiprofen 40 mg (LOCOA® TRANSDERMAL PATCH)

วิธีการแปะแผ่นยา

1. พับแผ่นยาเข้าหากันดังภาพ และลอกฟิล์มตรงกลาง (หมายเลข 1) ติดส่วนที่ลอกแล้วตรงบริเวณที่ต้องการ จากนั้นลอกฟิล์มหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ตามลำดับ



2. ในขณะที่ลอกฟิล์มหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ออก ให้ใช้มืออีกข้างกดแผ่นยาเพื่อให้ผิวเรียบตึง จะทำให้การติดง่ายขึ้นและไม่เกิดรอยย่น



วิธีลอกแผ่นยา

1. ให้เริ่มลอกแผ่นยาจากมุมใดมุมหนึ่ง โดยขณะที่ลอกให้ใช้มืออีกข้างจับผิวหนังรอบๆ ให้ตึงแล้วค่อยๆ ลอกแผ่นออกตามผิวหนัง (สามารถพรมน้ำช่วยขณะลอกแผ่นยาออก)
2. ไม่ควรกระชาก หรือดึงแผ่นออกในแนว 90 องศา เนื่องจากจะทำให้ผิวหนังบริเวณที่แปะเกิดการแดง คัน และมีผื่นขึ้นได้



คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้แผ่นแปะ

1. ยา 1 แผ่น แปะได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
2. หลังจากเปิดซองยา ให้ปิดถุงซิปล็อคให้สนิท
3. **ห้าม** แปะแผ่นยา มากกว่า 2 แผ่นต่อวัน
4. **ห้าม** แปะแผ่นยาบริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิด ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่น หรือมีเยื่อเมือก



OSTENIL® PLUS 2%

(40 MG/2ML SODIUM HYALURONATE)



ตัวยาสําคัญ : SODIUM HYALURONATE 2%

ความแรง : 40mg/2ml

กลุ่มยา : Antirheumatic, Miscellaneous;

Cartilaginous Defect Repair Agent Viscoelastic

รูปแบบยา : solutions for injections or infusions

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการปวดและการเคลื่อนไหวที่จำกัด ที่เกิดจากภาวะความเสื่อมของข้อเข่าและข้อสะโพก

ขนาดและวิธีใช้ : ฉีดเข้าข้อที่มีอาการ 1 เข็ม โดยผลการรักษาจะคงอยู่ได้นานถึง 6 เดือน

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C ห้ามแช่แข็ง

Item code : IOSTENILP40

Item Name : Ostenil Plus 40mg/2ml INJ 2ml

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 หลอด (pre-filled syringe)

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยาความแรงเดิมที่มีในสว.คือ Ostenil® 1.0%(20mg/2ml)



SII PNEUMOSIL™

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE CONJUGATE VACCINE (ADSORBED, 10-VALENT)

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

วัคซีนนี้คืออะไร

เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์คอนจูเกต ชนิดดูดซับ 10 สายพันธุ์ (Polysaccharide conjugate vaccine; PCV10)

ส่วนประกอบสำคัญ

- PCV10: เชื้อ *S. pneumoniae* 10 ซีโรไทป์ ได้แก่ **1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F**
- Carrier protein: CRM197
- Adjuvant: Aluminum phosphate

ข้อบ่งใช้: ใช้สำหรับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่รุกรานร่างกาย (Invasive disease) โรคปอดอักเสบและโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ซีโรไทป์ 1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F ในทารกและเด็ก อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี

ข้อห้ามใช้: ผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินหรือแพ้ส่วนประกอบใดๆ ในวัคซีน, ผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนโรคคอตีบ

ข้อควรระวังการใช้: เด็กทารกหรือเด็กโตที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ มีความผิดปกติใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด หรืออยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด

อาการไม่พึงประสงค์: ปวด บวม แดง หรือเป็นไตแข็งบริเวณที่ฉีด, มีไข้, หงุดหงิด, ไม่สบายตัว, ผื่นแดง, ง่วงซึม, ความอยากอาหารลดลง, ท้องเสีย

ผลิตภัณฑ์ที่มีใน S.W. ศรีนครินทร์

- SII PNEUMOSIL 1 Dose
- 0.5 ml/vial
- รูปแบบยา :
SUSPENSION FOR INJECTION



การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง หากพบว่าถูกแช่แข็งให้ทำการทิ้งวัคซีน

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ชำระเงินเองทุกสิทธิ)

ขนาดและการบริหารยา

- 0.5 มล. (1 Dose) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น
- ควรระวังการฉีดใกล้บริเวณเส้นประสาทและเส้นเลือด
- อายุ <1 ปี: กล้ามเนื้อต้นขาหน้าเยื้องไปทางด้านข้าง (Anterolateral aspect of the thigh)
- อายุ >1 ปี: กล้ามเนื้อ Deltoid ในส่วนต้นแขน
- ไม่ควรฉีดบริเวณกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteal area)
- ให้วัคซีนจำนวน 1-4 ครั้งขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มให้วัคซีน
- สามารถให้ร่วมกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเดี่ยวหรือวัคซีนรวม
- ห้ามผสมกับวัคซีนอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นในเข็มฉีดยาเดียวกัน




Pneumococcal vaccine

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccine) ที่มีใน ส.พ.ศรีนครินทร์

Pneumosil®

Prevnar13®

ผลิตภัณฑ์



บริษัทผู้ผลิต

Serum Institute of India

Pfizer

รูปแบบยาและ ขนาดบรรจุ

Suspension for injection, วัคซีน 1 dose (0.5 มล.)
รูปแบบ Prefilled syringe

ข้อบ่งใช้

ใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (*Streptococcus pneumoniae*) สายพันธุ์ที่มีอยู่ในวัคซีน

ในเด็กอายุ 6 สัปดาห์ จนถึง 2 ปี

- เด็กอายุ 6 สัปดาห์ จนถึงอายุ 17 ปี
- ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ส่วนประกอบ

- PCV10: เชื้อ *S. pneumoniae* 10 serotypes ได้แก่ 1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F
- Carrier protein: CRM197
- Adjuvant: Aluminum phosphate

- PCV13: เชื้อ *S. pneumoniae* 13 serotypes ได้แก่ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F และ 23F
- Carrier protein: CRM197
- Adjuvant: Aluminum phosphate

วิธีบริหารยา

ฉีดครั้งละ 0.5 มล. (1 Dose) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
จำนวน 1-4 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีด

อาการไม่พึง ประสงค์

ไข้, ปวด บวม หรือเป็นไตแข็งบริเวณที่
ฉีดยา, เบื่ออาหาร, ง่วงซึม, หงุดหงิด

ไข้, ปวด บวม หรือเป็นไตแข็งบริเวณที่ฉีดยา,
เบื่ออาหาร, หงุดหงิด, ง่วงซึม, นอนหลับไม่สนิท

การเก็บรักษา

เก็บในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 °C), ห้ามแช่แข็ง

เอกสารอ้างอิง

1. Lexicomp Online, Lexi-Drugs Online. Waltham, MA: UpToDate, Inc. Available from: <https://online.lexi.com>.

2. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. (2566). Pneumococcal Conjugate Vaccine [อินเทอร์เน็ต]. จาก

<https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1260620230308032551.pdf>

3. PNEUMOSIL® SIPL. Summary of Product Characterisation [อินเทอร์เน็ต]. จาก <https://cdsco.gov.in/opencms/resources/Upload>

CDSCOWeb/2018/ UploadSmPC/SmPC%20of%20Pneumosil%20vaccine%20by%20Ms%20Serum%20Institute.pdf


ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท ยาเดิมความแรงใหม่



ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

EVERPRESSIN® INJ

(เอฟเวอร์เพรสซิน)



ตัวยาสำคัญ : **TERLIPRESSIN ACETATE**

ความแรง : 0.2 mg/ml (เทียบเป็น Terlipressin 0.17 mg)

กลุ่มยา : Antidiuretic Hormone Analog ;
Hormone, Posterior Pituitary

รูปแบบยา : solutions for injection

ข้อบ่งใช้ :

- ใช้เพื่อรักษาภาวะเลือดออกจากเส้นเลือดขดในหลอดอาหารแตก (Bleeding Oesophageal Varices)
- รักษาอาการไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยตับแข็งรุนแรงและท้องมาน ตามการวินิจฉัยของแพทย์

ขนาดบรรจุ : 5ml/vial ; บรรจุกล่องละ 5 vials

การเก็บรักษา : เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ห้ามแช่แข็ง

Item Code : IEVERPRESS1

Item Name : Terlipressin(Everpressin) 1mg/5ml INJ 5ml

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

นำเข้าแทนยาเดิม : Glypressin® 1mg INJ

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท

ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง 15 g

ตัวยาสำคัญ : Methyl Salicylate + Menthol + Eucalyptus Oil



เปลี่ยนใช้ ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม 15 กรัม จาก GPO

แทนยาเดิมจากงานผลิตยา : **KK BALM ยาหม่อง 15 กรัม**

เปลี่ยนแปลงCODEยา : Item Code : EANALGPO15

Item Name :

Analgesic Balm(ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม GPO) Ointment 15g

ยาเดิมความแรงใหม่

LIVALO® TAB 4 mg

(ลิวาโล 4 มก.)

ตัวยาสำคัญ : Pitavastatin Calcium

กลุ่มยา : HMG-CoA Reductase Inhibitor



นำเข้าแทนยาความแรงเดิม : Livalo® 2 mg TAB

Item code : TLIVALO4

Item Name : Livalo 4 mg TAB

ขนาดบรรจุ : แผงละ 10 เม็ด/กล่องละ 10แผง

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท (ชั่วคราว)

LAMOTRIGINE 100 MG

เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า
Lamoga® 100mg (ลาโมกา)



แทนยาเดิม **Lamictal® 100 mg TAB**

เปลี่ยนแปลงCODEยา :

Item Name : Lamotrigine(Lamoga) 100 mg TAB

ขนาดบรรจุ กล่องละ 30 เม็ด (3x10's)

BISOPROLOL FUMARATE 5MG

เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า
HYPERCOR® 5mg (ไฮเปอร์คอร์)




แทนยาเดิม : **Bisloc® 5 mg TAB**

เปลี่ยนแปลง Code ยา : Item code : THYPERCOR5

Item Name : Bisoprolol(Hypercor) 5 mg TAB

ขนาดบรรจุ : แผงละ 10 เม็ด / กล่องละ 10แผง

MEDICATION Safety Alert!



เฝ้าระวัง Medication Error จากรายการยาเดิมความแรงใหม่

LIVALO® TAB


ตัวยาสำคัญ : Pitavastatin Calcium
ขณะนี้ มี 2 ความแรง คือ 2mg และ 4 mg



โปรดระมัดระวังในการจัด-จ่ายยา

หมายเหตุ : หักยา Livalo® 2 mg หหมดแล้ว นำออกจากบัญชียาพ.

OSTENIL® VS OSTENIL® PLUS



OSTENIL® 1%

20 mg/2 ml Sodium Hyaluronate

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด

เก็บที่อุณหภูมิ 2°C - 25°C



OSTENIL® PLUS 2%

40 mg/2 ml Sodium Hyaluronate

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 หลอด


เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C ห้ามแช่แข็ง



โปรดระมัดระวังในการจัด-จ่ายยา

เฝ้าระวัง Medication Error จากรายการยาเดิมเปลี่ยนบริษัท (ยาหลายความแรง)

HYPERCOR® Tablet ขณะนี้มี 2 ความแรง คือ 2.5 mg และ 5 mg



2.5mg



5mg



**โปรดระมัดระวัง
ในการจัด-จ่ายยา**

อ่านความแรงของยาซ้ำอีกครั้งก่อนจัด-จ่ายยา

