



ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง

การควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในหอผู้ป่วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดเตรียมเอกสาร โดย (Originator by)	ทบทวนเอกสารโดย (Reviewed by)	อนุมัติใช้เอกสารโดย (Approved by)
คณะทำงานพัฒนา ระบบยา	นางรัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม	(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า) รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีนครินทร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567	วันที่ 17 พฤษภาคม 2567	วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
--------------	---------------	--------------	----------------

(Document No.)	(Number of Revision)	(Number of Copy)	(Issued Date)
SP-H-002-01	01 วันที่แก้ไข (Date of Revision) 21 พฤษภาคม 2567	-	21 พฤษภาคม 2567

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)		
ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) เรื่อง : การควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในหอผู้ป่วย	เอกสารเลขที่ SP-H-002-01	หน้า 1/6
	วันที่เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2567	
ผู้จัดทำ : คณะทำงานพัฒนาระบบยา	แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่แก้ไข 21 พฤษภาคม 2567
ผู้ตรวจสอบ : นางรัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ ศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า (ตำแหน่ง) รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

สารบัญ

ตอนที่ หัวข้อ

1 วัตถุประสงค์

หน้า

2

2	ขอบเขต	2
3	คำจำกัดความ	2
4	ความรับผิดชอบ	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
6	เอกสารแนบ	5
7	บันทึกคุณภาพ	5
8	ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	5
9	ภาคผนวก	5
10	บันทึกการแก้ไข	6



**โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น**

(Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen
University)

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)	รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติใช้	หน้า
เรื่อง : การควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในหอผู้ป่วย	SP-H-002-01		21 พฤษภาคม 2567	2/6

1.วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้การจัดเก็บและบริหารจัดการยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในหอผู้ป่วยมีความปลอดภัย 2
- 1.2 มีระบบควบคุม ตรวจสอบ การใช้ยาเสพติดที่รัดกุม

2.ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้กับการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีด โดยครอบคลุมการให้บริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ศรีนครินทร์

3.คำจำกัดความ

ยาเสพติดให้โทษชนิดฉีดที่เก็บในหอผู้ป่วยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ได้แก่ ยา Morphine injection , Pethidine injection และ Fentanyl injection

ชื่อยา	ขนาดของยาที่มีใน รพ.
Morphine injection	3 mg และ 10 mg
Fentanyl injection	100 mcg และ 500 mcg
Pethidine injection	50 mg



**โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น**
(Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen
University)

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)	รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติใช้	หน้า
เรื่อง : การควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในผู้ป่วยป่วย	SP-H-002-01		21 พฤษภาคม 2567	3/6

4. ความรับผิดชอบ

- 4.1 แพทย์คีย์ลงยาเสพติดลงในระบบ Health Object (HO) เขียนคำสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ในใบ doctor's order sheet และแบบยส.5 โดยมีข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวิธีการให้ยา
- 4.2 พยาบาลหัวหน้าเวร ตรวจสอบจำนวนยาและหลอดเปล่าของยาที่ใช้แล้วก่อนการปฏิบัติงานในเวรนั้นๆ
- 4.3 พยาบาลที่ให้ยาผู้ป่วย หรือ เมื่อจะทำลายยาที่เหลือ ต้องมีพยานรู้เห็นที่เป็นพยาบาลอีกคนรับทราบการนำยาไปใช้กับผู้ป่วย
- 4.4 เภสัชกร จ่ายยาเสพติดตามใบสั่งยาใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่มีเอกสารการเบิกที่ครบถ้วนถูกต้อง
- 4.5 Logistic นำยาเสพติดที่เภสัชกรจัดและจ่ายยา ไปยังหอผู้ป่วยที่เบิก โดยให้พยาบาลผู้รับยา ลงชื่อรับยาในใบรับยาเสพติดและนำส่งคืนห้องยา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 การเก็บยาเสพติดให้โทษชนิดฉีด
 - 5.1.1 เก็บยาเสพติดให้โทษชนิดฉีดทั้งยาที่ยังไม่เปิดใช้ และ หลอดเปล่าของยาที่ใช้แล้วไว้ในตู้เก็บยาเสพติดซึ่งสามารถปิดล็อกกุญแจได้
 - 5.1.2 กรณีที่เบิกยาเสพติดให้โทษชนิดฉีดมาใหม่ ให้พยาบาลหัวหน้าเวรเก็บยาเข้าตู้เก็บยาเสพติด**ทันที**
 - 5.1.3 ปิดล็อกกุญแจตู้เก็บยาเสพติดทุกครั้ง

5.2 การเก็บกัญญาเสฟตติ

5.2.1 พยาบาลหัวหน้าเวร เก็บกัญญาเสฟตติไว้กับตัวเอง

5.2.2 กรณีพยาบาลหัวหน้าเวรไม่อยู่ในหอผู้ป่วยส่งมอบกัญญาเสฟตติให้กับหัวหน้าทีม หรือผู้พยาบาลที่ได้รับมอบหมาย

5.2.3 เมื่อเปลี่ยนเวร ส่งมอบกัญญาเสฟตติให้หัวหน้าเวรถัดไป



โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

(Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)	รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติใช้	หน้า
เรื่อง : การควบคุมยาเสฟตติให้โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในหอผู้ป่วย	SP-H-002-01		21 พฤษภาคม 2567	4/6

5.3 การตรวจนับยาเสฟตติชนิดฉีด

5.3.1 พยาบาลหัวหน้าเวร ตรวจนับจำนวนยาเสฟตติชนิดฉีด ก่อนรับเวร ทั้งยาที่ยังไม่เปิดใช้ หลอดเปล่าของยาที่ใช้แล้วพร้อมทั้งบันทึกลงในแบบตรวจนับยาเสฟตติ พยาบาลในเวรถัดมาตรวจนับจำนวน ยาเสฟตติชนิดฉีด และตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา กรณีมีการส่งเบิกที่ยังไม่ได้รับยาจากห้องยา

5.3.2 กรณีพบว่ายาเสฟตติให้โทษชนิดฉีดที่ใช้แล้ว และ/หรือยังไม่ได้ใช้ ไม่ครบ / สูญหายให้แจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือหัวหน้าเวร (กรณีนอกเวลาราชการ) ก่อนการรับ-ส่งเวร และทำบันทึกรายงานต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย

หัวหน้าหอผู้ป่วยส่งรายงานอุบัติการณ์ตามขั้นตอน และบันทึกข้อความขอเบิกยาทดแทน

5.4 การสั่งใช้ยาเสพติดชนิดฉีด แพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์เท่านั้น ที่มีสิทธิ์สั่งใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และลงนามในแบบ ยส.5 โดยเบิกเป็นยาเฉพาะรายบุคคล

5.5 การนำยาเสพติดให้โทษชนิดฉีดไปใช้

5.5.1 กรณีผู้ป่วยทั่วไป พยาบาลที่นำยาเสพติดชนิดฉีดไปใช้กับผู้ป่วย ให้ลงบันทึกการใช้ยาใน แบบควบคุมยาเสพติดประจำหอผู้ป่วย โดยมีพยาบาลคนที่ 2 เป็นผู้ทวนสอบการใช้ยา พร้อมลงลายมือชื่อในใบควบคุมยาเสพติด นำหลอดเปล่าของยาที่ใช้แล้วแนบใบ ยส.5 ที่มีข้อมูล ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวิธีการให้ยา ส่งเบิกที่ห้องยา

5.5.2 กรณีผู้ป่วยประคับประคอง แพทย์สั่งใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในระบบ HO ใบ doctor's order sheet และแบบ ยส.5 โดยมีข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวิธีการให้ยา ประทับตรา palliative ส่งเบิกยาที่ห้องยาโดยไม่ต้องใช้หลอดเปล่าของยาเสพติด เมื่อใช้ยาแล้วให้ส่งหลอดเปล่าของยาเสพติดคืนห้องยาตามจำนวนที่เบิก

5.5.3 ยาเสพติดเฉพาะราย

การเบิกยาครั้งแรกสำหรับใช้เฉพาะราย

5.5.3 การTransfer ยาเสพติด

5.5.3 กรณีผู้ป่วยใช้ยา Morphine bolus ใช้หลอด ขนาด 3 mg ให้ตามปริมาณคำสั่งแพทย์ หากเหลือให้ทำลาย มีการตรวจสอบโดยพยาบาล 2 คน คือ ผู้ที่ทำลายและผู้เป็นพยานพร้อมลงลายมือชื่อในแบบควบคุมยาเสพติด

5.5.4 กรณีผู้ป่วยใช้ยา Fentanyl bolus ใช้หลอด Fentanyl ขนาด 100 mcg ให้ตามปริมาณคำสั่ง

แพทย์ หากเหลือให้ทำลาย มีการตรวจสอบโดยพยาบาล 2 คน คือ ผู้ที่ทำลายและผู้เป็นพยานพร้อมลงลายมือชื่อในแบบควบคุมยาเสพติด



**โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น**

(Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen
University)

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)	รหัส เอกสาร	แก้ไข ครั้งที่	วันที่อนุมัติ ใช้	หน้า
เรื่อง : การควบคุมยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 ชนิดฉีดในผู้ป่วย ป่วย	SP-H-0 02-01		21 พฤษภาคม 2567	5/6

5.6 การควบคุม ตรวจสอบการใช้ยาเสพติด

5.6.1 กรณีพบว่ายาเสพติดชนิดฉีดสุญหาย ให้แจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยรับ
ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ

สอบสวนและบันทึกรายงานเพื่อเบิกทดแทนไปยังหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม/
หัวหน้างานบริการ/หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

5.6.2 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รายงานการสุญหายของยาเสพติดไปยัง
คณะกรรมการเภสัชกรรม ทุก 3 เดือน

5.6.3 หัวหน้าหอผู้ป่วยนิเทศ ติดตาม การใช้ยาเสพติดให้โทษชนิดฉีด
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

6. เอกสารแนบ

6.1 แบบควบคุมการใช้ยาเสพติด (เอกสารแนบ 1)

6.2 ใบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ยส.5) (เอกสารแนบ 2)


7. บันทึกคุณภาพ

7.1 บันทึกแบบควบคุมการใช้ยาเสพติด

8. ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

8.1 อัตราการสูญหายของยาเสพติดในหอผู้ป่วย

9. ภาคผนวก

[illegible]

Pethidine

เวอร์	จำนวนยา		การใช้ยา		การทิ้งยา		การเบิกยา	ผู้ตรวจสอบ
	amp เต็ม	amp เปล่า	ชื่อผู้ ป่วย	จำนวนยาที่ ใช้ (amp/ ซีซี)	ปริมาณยาที่ทิ้ง	ผู้ทิ้ง/ผู้ตรวจ สอบ	ชื่อผู้ป่วย	
ขี								
ป								
ด								

Fentanyl

เวอร์	จำนวนยา		การใช้ยา		การทิ้งยา		การเบิกยา	ผู้ตรวจสอบ
	amp เต็ม	amp เปล่า	ชื่อผู้ ป่วย	จำนวนยาที่ ใช้ (amp/ ซีซี)	ปริมาณยาที่ทิ้ง	ผู้ทิ้ง/ผู้ตรวจ สอบ	ชื่อผู้ป่วย	
ขี								

ป								
ด								

ติดตั้งเกอร์รายการเบิกยาค้น

